

MODALITA' DI RACCOLTA FECI HELICOBACTER PYLORI FECI

Raccolta feci: predisporre un contenitore pulito in cui raccogliere le feci reperibile in farmacia.

PREPARAZIONE

Nelle 4 settimane precedenti l'esame non si devono assumere:

- Antibiotici
- Inibitori della pompa protonica
- Antiacidi
- Preparazioni a base di sali di bismuto.

MODALITA' DI ESECUZIONE

- L'evacuazione delle feci deve avvenire in maniera spontanea, durante il periodo di raccolta non fare uso di lassativi, purghe, antidiarroici, supposte, o antimicrobici.
- Le feci vanno raccolte su una superficie asciutta e pulita (padella da letto, foglio di carta o sacchetto di plastica che possono essere appoggiati nel bidet, in una scodella o sotto il sedile copri water).
- Con l'apposita palettina prelevare una modesta quantità di feci, circa una palettina per ogni esame, e porla nel barattolo senza alcun conservante.
- Chiudere bene il contenitore.
- Il campione così prelevato deve essere consegnato in Laboratorio entro 12 ore dalla raccolta.

N.B. Non contaminare le feci con urine, sangue mestruale o acqua del water (non raccogliere le feci direttamente dal water).

CONSERVAZIONE

Prima della raccolta il flacone può essere conservato a temperatura ambiente.

Dopo la raccolta conservare i campioni in frigorifero.